

臨床診断例については、届出後であっても、血清抗体価の測定を実施するとともに、所在地の地方自治体に検体提出し、その結果について最寄りの保健所に報告していただき、検査結果等を総合的に勘案し、風しんでないと判断された場合は届出の取り下げ等のご協力いただきますようお願いいたします。

別記様式 5-2 2

風 し ん 発 生 届

都道府県知事（保健所設置市長・特別区長） 殿

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第 1 項（同条第 10 項において準用する場合を含む。）の規定により、以下のとおり届け出る。

報告年月日 令和 年 月 日

医師の氏名
従事する病院・診療所の名称
上記病院・診療所の所在地(※)
電話番号(※) () -
(※病院・診療所に従事していない医師にあっては、その住所・電話番号を記載)

1 診断（検案）した者（死体）の種類					
・患者（確定例） ・感染症死亡者の死体					
2 当該者氏名	3 性別	4 生年月日	5 診断時の年齢（0歳は月齢）	6 当該者職業	
	男・女	年 月 日	歳（ か月）		
7 当該者住所					
電話（ ） -					
8 当該者所在地					
電話（ ） -					
9 保護者氏名	10 保護者住所 （9、10は患者が未成年の場合のみ記入）				
	電話（ ） -				

病 型		13 感染原因・感染経路・感染地域
1)風しん（検査診断例）	2)風しん（臨床診断例）	①感染原因・感染経路（ 確定・推定 ）
11 症 状	・発熱（ 月 日出現） ・咳 ・鼻汁 ・結膜充血	1 飛沫感染（感染源となった風しん患者・状況： ）
	・発疹（ 月 日出現） ・リンパ節腫脹	2 接触感染（感染源となった風しん患者・物の種類・状況： ）
	・関節痛・関節炎 ・血小板減少性紫斑病	3 その他（ ）
	・脳炎（急性脳炎の届出をお願いします）	
	・その他（ ）	
		②感染地域（ 確定 ・ 推定 ）
		1 日本国内（ 都道府県 市区町村）
		2 国外（ 国 ）
		詳細地域（ ）
		※ 複数の国又は地域が該当する場合は全て記載すること。 渡航期間（出国日 年 月 日・入国日 年 月 日 国外居住者については 入国日のみで可）
12 診 断 方 法	陰性結果を含め実施したもの全て記載して下さい。	③風しん含有ワクチン接種歴
	(ア) 分離・同定による病原体の検出	1 回目 有（ 歳）・無 ・不明
	検体： 咽頭拭い液・血液・髄液・尿・その他（ ）	ワクチンの種類（風しん単抗原・MR・MMR・不明）
	検体採取日（ 月 日 ）	接種年月日（ S・H・R 年 月 日 ・不明）
	結果（ 陽性・陰性 ）	製造会社/L o t 番号（ / ・不明）
	遺伝子型：（ ）	2 回目 有（ 歳）・無 ・不明
	(イ) 検体から直接のPCR法による病原体遺伝子の検出	ワクチンの種類（風しん単抗原・MR・MMR・不明）
	検体： 咽頭拭い液・血液・髄液・尿・その他（ ）	接種年月日（ S・H・R 年 月 日 ・不明）
	検体採取日（ 月 日 ）	製造会社/L o t 番号（ / ・不明）
	結果（ 陽性・陰性 ・判定保留 ）	
(ウ) 血清 I g M抗体の検出	14 初診年月日 令和 年 月 日	
検体採取日（ 月 日 ）	15 診断（検案(※)）年月日 令和 年 月 日	
結果（ 陽性・陰性 ・判定保留 ）	16 感染したと推定される年月日 令和 年 月 日	
抗体価：（ ）	17 発病年月日（*） 令和 年 月 日	
(エ) ペア血清での抗体の検出	18 死亡年月日（※） 令和 年 月 日	
検体採取日（ 1回目 月 日 2回目 月 日 ）	19 その他感染症のまん延の防止及び当該者の医療のために必要と認める事項	
抗体価 （ 1回目 2回目 ）（単位 ）	・妊娠の有無(女性のみ)	
結果：抗体陽転・抗体価の有意上昇	有（ 週）・無 ・不明	
検査方法： HI ・ EIA ・ ELFA ・ LTI ・ CLEIA ・ LA		
その他（ ）		
(オ) その他の検査方法（ ）		
検体（ ）		
検体採取日（ 月 日 ）		
結果（ ）		
(カ) 臨床決定（ ）		

この届出は診断後直ちに行ってください

（病型、1、3、11から13、19欄は該当する番号等を○で囲み、4、5、14から18欄は年齢、年月日を記入すること。
（※）欄は、死亡者を検案した場合のみ記入すること。（*）欄は、患者（確定例）を診断した場合のみ記入すること。
11、12、19欄は、該当するものすべてを記載すること。）