

乳幼児・小中高生の予防接種

随時更新中!

実施医療機関はこちら



水戸市保健所 保健予防課 ☎243-7315

予防接種スケジュール

予防接種の種類	対象年齢 (標準的な接種開始時期)	接種回数	接種方法等	出生時	3か月	6か月	9か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳
ヒブ (インフルエンザ菌b型)	2か月～5歳未満 (生後2か月～7か月未満)	4回 <small>※接種開始年齢により接種回数が変わります</small>	初回：27日以上（標準的には27日～56日）の間隔で3回	↓	↓	↓																	
			追加：初回終了後、7月以上（標準的には7月～13月）の間隔で1回	↓																			
小児肺炎球菌			初回：27日以上（標準的には生後12月までに）の間隔で3回	↓	↓	↓																	
			追加：初回終了後、60日以上の間隔で1回（標準的には生後12月～生後15月）	↓																			
B型肝炎 ※1	1歳未満 (生後2か月～9か月未満)	3回	初回：27日以上の間隔で2回	↓	↓																		
			追加：1回目から139日以上の間隔で1回	↓																			
BCG (結核)	3か月～1歳未満 (生後5か月～8か月未満)	1回	-			↓																	
ロタウイルス	1価 生後6週0日～24週0日 (14週6日までに)	2回	27日以上の間隔で2回	↓	↓																		
	5価 生後6週0日～32週0日 (14週6日までに)	3回	27日以上の間隔で3回	↓	↓	↓																	
4種混合 (ジフテリア・破傷風・百日せき・不活化ポリオ)	3か月～7歳6か月未満 (生後3か月～1歳未満)	4回	初回：20日以上（標準的には20日～56日）の間隔で3回			↓	↓	↓															
			追加：初回終了後、6月以上（標準的には12月～18月）の間隔で1回																				
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	11歳～13歳未満 (11歳～12歳未満)	1回	-																				
水ぼうそう ※2	1歳～3歳未満 (1歳～1歳3か月未満)	2回	3月以上（標準的には6月～12月）の間隔で2回					↓	↓														
麻しん風しん混合	1期 1歳～2歳未満	1回	-					↓															
	2期 小学校就学前の1年間	1回	-																				
日本脳炎 ※3	1期 6か月～7歳6か月未満 (初回3歳～4歳未満)	3回	初回：6日以上（標準的には6日～28日）の間隔で2回																				
	2期 9歳～13歳未満 (9歳以上10歳未満)	1回	追加：初回終了後、6月以上（標準的には1年）の間隔で1回																				
子宮頸がん ※4	2価 小学6年生～ 高校1年生の女子	3回	1月以上の間隔で2回																				
	4価 高校1年生の女子 (中学1年生)		1回目～5月以上かつ2回目～2月半の間隔で1回																				
			1月以上の間隔で2回																				
			2回目～3月以上の間隔で1回																				

 及び は予防接種法で
 接種が定められている年齢です。
 の期間中にできるだけ接種を
 しましょう。 ↓ 接種時期

定期接種・個人負担金なし

